

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成28年11月30日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19184号	コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	BASFジャパン(株)
第19185号	クミアイコテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	クミアイ化学工業(株)
第19186号	日曹コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	日本曹達(株)
第23444号	協友コテツフロアブル	クロルフェナピル水和剤	協友アグリ(株)

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### 《作物削除》

- ・ 作物名「非結球レタス」を削除する。
- ・ 作物名「バナナ」を削除する。

##### 《使用時期変更》

- ・ 作物名「ぶどう」、使用方法「散布」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫60日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「しゅんぎく」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。

##### 《非結球あぶらな科葉菜類の変更》

- ・ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまなを除く）」を、作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまな、チンゲンサイ、さんとうさいを除く）」とし、使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「チンゲンサイ」を追加し、使用時期を「収穫7日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。
- ・ 作物名「さんとうさい」を追加し、使用時期を「収穫3日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェピルを 含む農薬の 総使用回数	
非結球レタス	ハスモンヨトウ、材タバコガ ナメグリハエ、ヨウムシ	2000 倍	100～ 300L /10a	収穫 3 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
バナナ	バナナツヤオサリウムシ			収穫 14 日前 まで				
ぶどう	チャノキアザミウマ、 フタテンヒメコハエ、 ミカンキアザミウマ、 ブドウサビダニ	2000～ 4000 倍	200～ 700L /10a					
	ナミハダニ、カンザワハダニ ハスモンヨトウ、トビイロトラカ モンキクロメイガ、ミカガ類 コガネムシ類	2000 倍		100～ 300L /10a	収穫前日 まで			
ブロッコリー	コガ、アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ		収穫 3 日前 まで		1 回			1 回
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまなを除く)	コガ		収穫前日 まで		2 回以内			2 回以内
しゅんぎく	ハスモンヨトウ							

〔変更後〕

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェピルを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	チャノキアザミウマ、 フタテンヒメコハエ、 ミカンキアザミウマ、 ブドウサビダニ	2000～ 4000 倍	200～ 700L /10a	収穫 60 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ナミハダニ、カンザワハダニ ハスモンヨトウ、トビイロトラカ モンキクロメイガ、ミカガ類 コガネムシ類	2000 倍		100～ 300L /10a			
ブロッコリー	コガ、アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ		収穫 14 日前 まで				
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまな、 チンゲンサイ、 さんとうさい を除く)	コガ		収穫 7 日前 まで				
チンゲンサイ		収穫 3 日前 まで					
さんとうさい		収穫 14 日前 まで	2 回以内	2 回以内			
しゅんぎく	ハスモンヨトウ						

**【 変更理由 】**

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果に基づき、登録変更をすることとしたため。

**【本件のお問い合わせ先】**

植物防疫係 山田

TEL:027-226-3038

FAX:027-221-8681

## 平成28年度版防除指針における変更点

### ○変更内容

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

#### 1) コテツフロアブル

（第19184号 クロルフェナピル水和剤）

#### 【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピルを 含む農薬の 総使用回数		
非結球レタス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ ナメコリバエ、ヨウムシ	2000倍	100～ 300L /10a	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、 フタテンヒメヨコバイ、 ミカンキイロアザミウマ、 ブドウサビダニ	2000～ 4000倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで					
	ナミハダニ、カンザワハダニ ハスモンヨトウ、トビイロトラガ モンキクロメイトガ、ミカガ類 コガネムシ類	2000倍							
ブロッコリー	コガガ、アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ	2000倍						100～ 300L /10a	収穫前日 まで
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまなを除く)	コガガ								収穫3日前 まで
しゅんぎく	ハスモンヨトウ				収穫前日 まで	2回以内	2回以内		

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェニルを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、 フタテンヒメヨコハシ、 ミカンキイロアザミウマ、 ブドウサビダニ	2000～ 4000 倍	200～ 700L /10a	収穫 60 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ナミハダニ、カンザワハダニ ハスモンヨトウ、トビイロトラガ モンキクロメイトガ、ミカガ類 コガネムシ類						
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000 倍	100～ 300L /10a	収穫 3 日前 まで	1 回		1 回
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 ひろしまな、 チンゲンサイ、 さんとうさい を除く)	コナガ			収穫 14 日前 まで			
しゅんぎく	ハスモンヨトウ			収穫 14 日前 まで	2 回以内	2 回以内	